

يخضع جميع الأطفال المولودين في و لاية كارولينا الشمالية لفحص عند الولادة للكشف عن بعض الأمراض أو المشاكل الصحية الخطيرة، التي يمكن علاجها إذا أكتُشفت مبكرًا. قد يظهر فحص طفاك حديث الولادة أنّه مصابًا بداء عديد السكاريد المخاطي من النمط الثاني؛ وعليه، سيُحول طفاك إلى أحد الأخصائيين لإجراء مزيد من الفحوصات للتأكد من التشخيص.

إن اكتشاف داء عديد السكاريد المخاطي من النمط الثاني ومعالجته في مرحلة الطفولة المبكرة يمكن أن يساعد في الوقاية أو تأخير العديد من المشاكل الصحية المرتبطة بالمرض، مع أن داء عديد السكاريد المخاطي من النمط الثاني لا يظهر غالبًا عند الولادة.

ما داء عديد السكاريد المخاطي من النمط الثاني؟

داء عديد السكاريد المخاطي من النمط الثاني، المعروف أيضًا باسم متلازمة "هنتر"، هو اضطراب وراثي نادر يمكن أن يؤثر على أجزاء عديدة من الجسم؛ فالمصابون بهذا المرض لا يستطيعون تفكيك مجموعة من السكريات المعقدة تُسمّى الغليكوز أمينو غليكانات (GAGs) بسبب نقص إنزيم يُسمّى إيدرونات-2-سلفاتاز (12S)، والذي يؤدي إلى تراكم هذه المواد في الخلايا، مسببةً مشاكل صحية متعددة.

ماذا تعنى نتيجة فحص الأطفال حديثي الولادة غير الطبيعية؟

يخضع الأطفال حديثي الولادة للكشف عن داء عديد السكاريد المخاطي من النمط الثاني عن طريق إجراء اختبارين على عينة دم مأخوذة من كعب القدم بعد الولادة، غالبًا بعد مرور 24 ساعة. أولًا، يقيس مختبر فحص الأطفال حديثي الولادة مستوى إنزيم طفاك. وإن كان مستوى الإنزيم منخفضًا جدًا، يُجرى اختبار ثان لقياس مستوى الغليكوز أمينو غليكانات (المعروف أيضًا بمستوى داء عديد السكاريد من النمط الثاني). وتُظهر النتائج احتمال الإصابة بداء عديد السكاريد من النمط الثاني، لأن كلا الإختبارين أظهرا نتائج غير طبيعية.

ما أعراض داء عديد السكاريد المخاطي من النمط الثاني؟

قد تختلف الأعراض حسب شدة المرض؛ فقد تظهر على الأطفال المصابين بالشكل الشديد علامات في السنة الأولى من العمر، وتزداد تدريجيًا. وقد لا تظهر الأعراض إلا في مرحلة الطفولة المتأخرة وتزداد ببطء في الشكل الأقل شدة. تختلف الأعراض المحتملة ويمكن أن تشمل ما يلى:

- تأخر في التطور الحركي أو اللُّغوي (مثل تأخر الكلام أو المشي)
 - حجم رأس أكبر من الطبيعي
 - فقدان السمع
- ملامح وجه مميزة، مثل بروز الجبهة، واتساع الأنف، وتضخم اللسان
 - سيلان مزمن في الأنف
 - التهابات متكررة في الجهاز التنفسي العلوي
 - انتفاخ البطن نتيجة تضخم الكبد والطحال
 - كتلة كبيرة أو انتفاخ (فتق) حول زر البطن (فتق السرة) أو
 - منطقة الحفاضات (فتق أربي)
 - تيبّس المفاصل

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

سيفحص أحد الأخصائيين في مركز موينزر لداء عديد السكاريد المخاطي، التابع لمؤسسة الرعاية الصحية لجامعة كارولينا الشمالية في تشابل هيل، طفلك وسيُجري تقييمات إضافية و اختبارات متابعة للتأكد مما إذا كان طفلك مصابًا بداء عديد السكاريد المخاطي من النمط الثاني. سيتحقق أحد الاختبارات من تراكم أو ارتفاع مستوى الغليكوز أمينو غليكانات، وهي سكريات معقدة، في بول طفلك. بينما يقيس الاختبار الثاني مستوى منخفض من إنزيم 125 في الدم. وقد تكون هناك حاجة لإجراء اختبارات إضافية حسب نتائج فحص طفلك حديث الولادة، وستُنسق مع مقدمي الرعاية في مركز موينزر لداء عديد السكاريد المخاطي.

لأي استفسارات، يُرجى الاتصال بالمركز على الرقم التالي (919-2432-2432).

كيف يُعالَج داء عديد السكاريد المخاطي من النمط الثاني؟

لعلاج الموصى به لداء عديد السكاريد المخاطي من النمط الثاني هو العلاج الإنزيمي التعويضي (ERT) عن طريق الحقن الوريدي أسبو عيًّا؛ لتعويض الإنزيم المفقود لدى طفلك. قد تتوفر خيارات علاجية أخرى سيناقشها معك مقدم الرعاية لطفلك. إن شُخص طفلك بداء عديد السكاريد المخاطي من النمط الثاني، فسيُحال أيضًا إلى أخصائيين آخرين لمتابعة رعايته بشكل شامل.

العلاج متوفر هنا في ولاية كارولينا الشمالية، وسيطلعك الأخصائيون في مركز موينزر لداء عديد السكاريد المخاطي على جميع الخيارات العلاجية المتاحة أثناء زيارتك.

ين يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات؟

يمكن استخدام كاميرا الهاتف لمسح رموز الاستجابة السريعة (QR) أدناه

مركز موينزر لأبحاث وعلاج داء عديد السكاريد المخاطي 🖸

• لاستفسار عن نتيجة فحص طفلك حديث الولادة أو للتحدث مع أحد موظفي مركز داء عديد السكاريد المخاطي، يُرجى الاتصال بالرقم التالي: 919-2432-2432.



🗹 Baby's First Test برنامج





مركز معلومات فحص الأطفال حديثي الولادة 🖸



