

Virus de la viruela símica

Lo que necesita saber



Brote de viruela símica en ESTADOS UNIDOS 2022

Cualquier persona puede contraer la viruela símica, pero muchos de los casos identificados en el brote actual han sido en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, gracias en parte a la vigilancia de aquellos que buscaron pruebas cuando surgieron preocupaciones que llevaron al reconocimiento de que la viruela símica se estaba propagando en los Estados Unidos.

La enfermedad se acompaña con una erupción de piel, que puede aparecer como granos o ampollas, a menudo con una enfermedad similar a la influenza anteriormente. La erupción comienza plana y luego se vuelve irregular y se llena de líquido antes de formar costras y resolviéndose. Esto sucede durante un período de 2 a 4 semanas. Las erupciones pueden estar en todo el cuerpo, incluso en las palmas de las manos, los pies y la cabeza, o localizarse solo en partes específicas del cuerpo, como los genitales o alrededor de las nalgas.

Actualizado a nivel mundial y de EE. UU. los números de caso se publican en el sitio de los CDC [aquí](#).

Transmisión

La viruela símica se transmite de persona a persona a través del contacto directo de piel a piel, teniendo contacto con una erupción de piel infecciosa, a través de fluidos corporales o a través de secreciones respiratorias. Tal contacto a menudo ocurre durante el contacto prolongado cara a cara o durante el contacto físico íntimo, como besos, abrazos o relaciones sexuales.

Las personas que no tienen síntomas de viruela símica no pueden transmitir el virus a otras personas. Obtenga más información sobre cómo se propaga la viruela símica y un resumen del brote en los EE. UU. 2022: <https://bit.ly/3bczSjE>

<https://bit.ly/3bczSjE>

Vacunas y elegibilidad

Las vacunas están disponibles en un suministro limitado, sin costo alguno, para las personas con exposición conocida o sospechada a la viruela símica. Esto incluye:

1. Cualquier persona que haya tenido contacto cercano en las últimas dos semanas con alguien que haya sido diagnosticado con viruela símica; o
2. Homosexuales, bisexuales u otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, o personas transgénero, que son sexualmente activos; o
3. Personas que han tenido contacto sexual con hombres homosexuales, bisexuales, u otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, o personas transgénero en los últimos 90 días; o
4. Personas que viven con el VIH, o que toman medicamentos para prevenir el VIH (PrEP), o que fueron diagnosticados con sífilis en los últimos 90 días.

Las personas que cumplen con estos criterios pueden llamar a su [departamento de salud local](#) para hacer una cita para recibir la vacuna, o pueden llamar a uno de los siete departamentos de salud local a continuación.

• Buncombe (828) 250-5300	• Forsyth (336) 703-3100	• New Hanover (910) 798-6800
• Cumberland (910) 433-3600	• Guilford (336-641-3245	• Pitt (252) 902-2300
• Durham (919) 560-9217	• Mecklenburg (980) 314-9400	• Wake (919) 212-9398

Prevención

Si tiene una erupción de piel inexplicable, llagas u otros síntomas, consulte a su proveedor de atención médica; si no tiene un proveedor o seguro médico, comuníquese con su departamento de salud local. Mantenga la erupción cubierta y evite tener relaciones sexuales o tener intimidad con cualquier persona hasta que haya sido revisado por un proveedor de atención médica. Evite las reuniones en persona.

Los limpiadores y detergentes domésticos estándar son efectivos para limpiar superficies y ropa de cama.



Se puede encontrar información actualizada sobre la viruela símica utilizando este código QR. Compártalo con sus amigos y familiares.